

I disordini dell'elaborazione sensoriale possono causare problemi nella vita quotidiana e influenzare la funzione sociale ed emotiva delle persone.

A che età si può individuare un disordine nell'elaborazione sensoriale?

Già nell'infanzia. Alcuni segni possono essere evidenti anche nei neonati come:

- reazioni inusuali o eccessive a stimoli sensoriali
- difficoltà nell'adattamento a nuove situazioni
- difficoltà nelle abilità motorie e nelle funzioni esecutive

I disordini di elaborazione sensoriale si possono manifestare sotto varie forme e colpiscono sia i bambini che gli adulti, ecco perché è consigliata la valutazione dei nostri professionisti.

---

## VALUTAZIONE DEL DISORDINE SENSORIALE

### FIRENZE

*Luca Ronga - posturoterapeuta*  
Cell. 327 6784928

### MILANO

*Silvia Micheli - psicologa*  
cell. 349 7150826  
*Sergio Rocco - posturoterapeuta*  
cell. 348 2237706


### ROMA

*Assunta Izzo - logopedista*  
cell. 347 6319985  
*Fabio Passafiume - fisiatra*  
cell. 340 5114546

[haneurosensoriale@gmail.com](mailto:haneurosensoriale@gmail.com)

[www.humanarchetype.org](http://www.humanarchetype.org)

---



Una risposta dai  
piccoli ai grandi disagi  
dello sviluppo del tuo  
bambino

[www.humanarchetype.org](http://www.humanarchetype.org)



## Segnali di scarsa coordinazione

- anticipo o ritardo nel raggiungimento delle tappe evolutive (0-12 mesi)
- camminare sulle punte
- percezione corporea immatura
- scarso equilibrio
- goffaggine nei movimenti
- cattiva impugnatura
- difficoltà nel praticare sport

## Segnali di ipo/ipersensibilità uditiva

- reazioni esagerate ai suoni, comportamenti eccessivi di allerta
- irritabilità, ansia, scarsa partecipazione ad attività in ambienti rumorosi
- difficoltà di concentrazione e comprensione in ambienti rumorosi se pur con suoni lievi
- reazioni fisiche, sensazione di stanchezza senza un'eccessiva attività
- Dolori di testa o sudorazione in ambienti rumorosi.



## Segnali di ipo/ipersensibilità tattile

- **Reazione esagerata al contatto fisico**
- **Fastidio al contatto di etichette e cuciture**
- **Intolleranza al vestiario**
- **Selettività nel mangiare**
- **reazioni cutanee**